

Aus der geburtshilf., gynäkolog. Abteilung des Johanniter-Krankenhauses Friedrich-Wilhelm-Stiftung Bonn
Derz. Leiter: Prof. Dr. Cramer.

Die Behandlung der Fehlgeburt mit Terpentinöl



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn



Vorgelegt am 3. Februar 1937

von

Paul Böckmann

Arzt

aus Wadersloh i. Westf.

BONN 1937

Anton Brand, Bonn

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Cramer.
Korreferent: Prof. Dr. Siebke.



Die zunehmende Bedeutung, die der Fehlgeburt besonders in bevölkerungspolitischer Hinsicht zukommt, stellt den Arzt immer wieder vor die Frage der besten Behandlungsart dieser wohl wichtigsten und häufigsten Störung der Schwangerschaft.

Die wesentliche Aufgabe bei der Behandlung des Abortes besteht darin, einerseits einen drohenden Abort mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln (strenge Bettruhe, Wehenausschaltung durch Opiate u. a.) aufzuhalten zu versuchen, andererseits aber muß der Arzt bemüht sein, wenn ein Abort nicht mehr aufzuhalten ist, ihn unter Vermeidung von Komplikationen auf schnellstem und sicherstem Wege zu Ende zu führen. Hierbei steht der Arzt oft vor der Entscheidung, aktiv einzugreifen und notwendige operative Maßnahmen vorzunehmen; hier gehen die Meinungen, besonders soweit es sich um die Behandlung des fieberhaften Abortes handelt, sehr weit auseinander, und auch heute hat die sehr lebhaft geführte Diskussion der beiden letzten Jahrzehnte noch zu keiner völligen Einigung geführt.

Einer mehr exspektativen bzw. konservativen Behandlung standen zu allen Zeiten Anhänger eines mehr oder weniger aktiven Vorgehens gegenüber; letztere beschäftigte wieder die Frage, ob digital oder instrumentell eingegriffen werden soll.

Bis ungefähr zum Jahre 1911 haben fast alle Geburtshelfer das besonders von Fehling (1878) empfohlene und durch Einführung der Curette begünstigte aktive Vorgehen angewandt, bis Anhänger einer mehr konservativen Methode ihre Stimmen erhoben. Winter, Traugott und Walthard brachten zum erstenmal strenge Indikationen für eine aktive Behandlung des febrilen Abortes unter ausschlaggebender Verwertung der bakteriologischen Untersuchung. Dabei schloß Winter die Aborte mit haemolytischen Streptokokken von der aktiven Therapie aus, während Walthard und Traugott die abwartende Behandlung auch bei An-

wesenheit des die Gelatine verflüssigenden *Staphylococcus pyogenus aureus* verlangen.

Heynemann faßt die einzelnen Behandlungsmethoden folgendermaßen zusammen:

1. Die konservative Behandlung des fieberhaften Abortes bei der grundsätzlich die spontane, lediglich durch Wehenmittel beförderte Ausstoßung des Uterusinhaltes abgewartet wird.

2. Die exspektative; hier wird abgewartet, bis eine bestimmte Zeit, etwa 3 bis 8 Tage, nach der Entfieberung vergangen ist; dann wird ausgeräumt, sofern nicht schon vorher die spontane Ausstoßung erfolgt ist.

Bei 1. und 2. wird die lebensbedrohliche Blutung als Indikation zum Eingreifen anerkannt. Die Verwertung der Bakteriologie für die Indikationsstellung im Sinne Winters und Walthards wird überwiegend abgelehnt.

3. Die aktive Behandlung, die grundsätzlich jeden fieberhaften Abort ausräumt. Jede Entzündung in der Umgebung des Uterus wird jedoch als Kontraindikation gegenüber dem Eingriffe angesehen.

4. Vereinzelt wird auch die Kontraindikation nicht anerkannt, sondern stets ausgeräumt.

5. Die gemäßigt aktive oder exspektativ-aktive Behandlung. Es wird einige Zeit abgewartet, um das Bestehen von Komplikationen in der Umgebung des Uterus möglichst sicher ausschließen zu können. Ist keine Komplikation erkennbar, so wird ausgeräumt ohne Rücksicht auf bestehendes Fieber und Keimbefund.

Für und wider eine aktive Therapie des fieberhaften Abortes sind von allen Seiten die verschiedensten Gründe ins Feld geführt worden.

Für ein aktives Eingreifen spricht zunächst einmal die Beobachtung, daß in fast allen Fällen nach der Ausräumung ein prompter Abfall selbst hoher Temperaturen eintritt. Gerade dieser augenfällige Erfolg war den Anhängern der aktiven Behandlung maßgebend, ihrem Verfahren treu zu bleiben. Denn einerseits ist die Entfernung des infektiösen Materials aus dem Uterus von großem

Vorteil, andererseits darf aber nicht geleugnet werden, daß durch die Manipulationen bei der Ausräumung Schaden zugefügt werden kann. „Dafür spricht die Tatsache, daß nach künstlicher Entleerung des Uterus in einer großen Reihe von Fällen ein Schüttelfrost auftritt, sogar auch dann, wenn die Patientin überhaupt nicht fiebert hat“ (Halban).

Auch Stöckel weist darauf hin, daß nicht selten ein heftiger Schüttelfrost mit Temperaturerhöhung bis auf 40° nach der Ausräumung auftritt, wobei er betont, daß ein einziger Schüttelfrost bei unverändertem Puls beinahe zum normalen klinischen Bild gehöre.

Auch wir beobachteten in 15,2% der fieberfrei eingelieferten Fälle eine sekundäre Temperatursteigerung.

Diese kommt dadurch zustande, daß entweder eine Fehlgeburt vor der Behandlung noch fieberfrei und doch schon infiziert ist und der initiale Schüttelfrost unmittelbar bevorsteht, oder aber dadurch, daß durch die Ausräumung infektiöses Material in die Blutbahn gelangt ist; dabei sind es Keime, die einmal von außen in den Uterus hineingetragen werden, ein anderes Mal aber breitet sich die Infektion von dem im Uterus vorhandenen Material aus.

Denn histologische Untersuchungen haben gezeigt, daß „Blutgerinnsel und durchblutete, geschädigte und nekrotische Plazentarreste und Decidua ganz in erster Linie Sitz und Wucherungsstätte der Keime sind, während das lebende Gewebe und die Uteruswand wenigstens im allgemeinen davon frei bleiben. Die Ausnahmen, in denen die Keime auch in den Blutgefäßen und den Lymphbahnen der Uteruswand in größerer Menge vorhanden sind, stellen meist besonders schwere Infektionen dar“ (Heynemann).

Allein diese Tatsache, daß durch langes Abwarten infolge Verbleibens des infektiösen Materials im Uterus die Gefahr einer Allgemeininfektion neben einer durch langandauernde Blutungen bedingten Schwächung des Organismus wächst, rechtfertigt eine sofortige Ausräumung.

Gerade dem praktischen Arzt ist ein Abwarten oft unmöglich, da er gezwungen ist, sich augenblicklich zu entscheiden und zu han-

deln. Denn langes Herumwarten draußen auf dem Lande ist sehr kostspielig und zu gefährlich, weshalb D ö r f l e r auch dem Praktiker empfiehlt, jeden septischen Abort durch Ausräumung des Uterus aktiv zu beenden, und zwar mit der Curette. D ö r f l e r ist als prakt. Arzt, bei einer großen Erfahrung auf diesem Gebiete, mit einem solchen Verfahren immer gut gefahren.

St ö c k e l betont die Ungefährlichkeit einer rechtzeitig und richtig durchgeführten aktiven Aborttherapie. „Diese soll deshalb einsetzen, wenn ein im Gang befindlicher Abort nicht mehr aufzuhalten ist. Das ist dann der Fall, wenn der Cervikalkanal schon teilweise eröffnet, die Portio verkürzt ist und die Spitze des gelösten unteren Eipols sich in den äußeren Muttermund vorwölbt“ (St ö c k e l).

Ein weiterer Vorzug der aktiven Behandlung ist der, daß die oft sehr erhebliche Blutung akut zum Stillstand gebracht werden kann, und damit der Gefahr einer immerhin möglichen Verblutung vorgebeugt werden kann, wenn auch von Anhängern der konservativ-exspektativen Methode der Einwand gemacht wird, daß auch bei der Ausräumung mit einem größeren Blutverlust zu rechnen sei.

J a f f e sagt: „Wenn dagegen die Blutung eine bedenkliche Höhe erreicht hatte oder Zersetzungs Vorgänge, die ein übelriechender Ausfluß verrät, Platz greifen, ebenso in allen Fällen von unvollkommenem Abortus mit stärkerer Blutung darf mit der künstlichen Entfernung des gesamten Uterusinhaltes nicht mehr gezögert werden.“

Ferner erreicht man durch die aktive Aborttherapie eine erhebliche Abkürzung des Krankenlagers, welches allein in wirtschaftlicher Hinsicht oft von großer Bedeutung ist. G. A. W a g n e r fand bei einer aktiven Therapie eine Behandlungsdauer von 4—5 Tagen gegenüber einer solchen von 9—16 Tagen bei konservativ-exspektativen Behandlung unter Ausschaltung von Komplikationen; in anderen Statistiken wird eine durchschnittliche Behandlungsdauer von 7 bis 15,1 Tagen bei aktiver Behandlung angegeben und eine solche von 9,8 bis 16,79 Tagen bei exspektativer Behandlung.

Soll man bei der Ausräumung manuell oder mit der Curette

vorgehen? Auch in dieser Frage gehen die Meinungen der Autoren weit auseinander.

W i n t e r sagt in seiner 12jährigen Diskussion über den fieberhaften Abort: „Immerhin muß man die Frage aufwerfen, ob denn unsere vorwiegend geübte manuelle Ausräumung nicht doch die Hauptschuld an den schlechten Resultaten der aktiven Behandlung gegenüber der konservativen und exspektativen Behandlung trägt.“ Dabei betont W i n t e r besonders den Vorteil, daß der Uterus vollständig in seiner Ruhelage erhalten werden kann, von außen nicht gedrückt und bewegt zu werden brauche; ein weiterer Vorteil sei, daß die Eiteile vorsichtig in ihren Lösungsschichten abgeschabt, und bei sanftem Gebrauche jede Verletzung der lebenden Gewebe vermieden werden könne. Gerade hierin sehen wir den großen Vorteil der Curettage besonders beim infizierten Abort, wo das Hauptgewicht auf die schonendste Uterusentleerung zu legen ist.

Durch eine manuelle Ausräumung bleiben nicht selten Eiteile und besonders Placentamassen im Uterus zurück, von denen dann die Infektion sich weiter ausbreiten kann. Deshalb muß immer wieder gefordert werden, daß die letzten Reste aus dem Uterus entfernt werden, was am besten mit der Curette zu erreichen ist.

Dazu kommt der Vorteil, daß bei dem Gebrauche der Curette der Muttermund weniger stark erweitert zu sein braucht, und der ganze Eingriff rascher, schonender und müheloser ausgeführt werden kann als die digitale Ausräumung.

Allerdings muß hier auf die Gefahr der Uterusperforation mit der Curette hingewiesen werden, die häufig mit tödlicher Blutung oder Peritonitis ausgeht.

Auch in unseren untersuchten Fällen befindet sich eine derartige Perforation des Uterus, die gelegentlich einer kriminellen Abtreibung von einem Arzt verursacht wurde. Die Perforation war so heftig, daß es zu einer Abreißung des rechten Ligamentum ovarii gekommen ist. Bei der Einweisung ins Krankenhaus wurde sogleich die Perforation erkannt und die sofortige Laparotomie angeschlossen. Eine Uterusamputation konnte die Patientin nicht mehr retten, sie starb an den Folgen einer Peritonitis. Bei der Besprechung der

Todesursachen kommen wir noch einmal auf diesen Fall zurück (Fall 3, S. 26).

Für die Prognose der Perforation ist es wichtig, daß der Operateur sofort diese erkennt, um einen tödlichen Ausgang verhindern zu können. Die Curettage muß sofort abgebrochen werden und bei großen Perforationen die Laparotomie oder die vaginale Freilegung erfolgen. In manchen Fällen kann eine Uterusamputation oder selbst eine sofortige Totalexstirpation die Patientin noch retten. Aber auch zu oft erlebt man, wie in unserem Falle, einen tödlichen Ausgang.

Die Ursache für die Uterusperforationen liegen zumeist in der Benutzung schlechter oder gar falscher Instrumente wie zu kleiner Curetten oder zu spitzer Abortzangen.

Stöckel rechnet zu den falschen Instrumenten vor allem auch die Kornzange, die, weil zu spitz, unter keinen Umständen zur Extraktion von Eiteilen benutzt werden soll.

v. Jäschke warnt besonders vor der Anwendung eines scharfen Löffels und scharfer Curetten, auch vor dem Gebrauche der Kornzange. Er gestattet nach digitaler Ablösung des Eies die Benutzung der Winter'schen Abortzange und rät, sich erst dann einer großen stumpfen Curette zu bedienen, falls nur noch kleine Eihaut- oder Plazentaresten im Uterus vorhanden sind, ferner bei subinvolutio post abortum, sowie zur Entfernung der auch nach digitaler Ablösung des Eies oder eines Plazentarpolypen leicht zurückbleibenden Decidua.

Bei gutem Instrumentarium ist es oft die mangelhafte Technik, auf die die Uterusperforation zurückzuführen ist.

Wir halten die Curette in der geübten Hand des Praktikers für relativ ungefährlich, erlebten wir doch in unseren fast 1000 mit der Curette behandelten Fällen keine einzige Perforation.

Ludwig sagt: „Eine forcierte manuelle Ausräumung mit Herumbohren am Muttermund ist entschieden gefährlicher als schonende Anwendung der Curette“.

Auch in der Statistik ist für die Ausräumung mit der Curette von F. A. Dietrich eine günstigere Mortalitätsziffer von 3,4%

errechnet gegenüber 4,4% bei der Curettage mit Austaftung, und 5,9% bei rein digitaler Ausräumung.

P. T h e o d o r hat nach Heynemann nach instrumenteller Ausräumung in 15% der Fälle Keime im Blut nachgewiesen, nach der digitalen aber in 77%.

Schließlich ist auch die spontane Ausstoßung des infizierten Abortes nicht völlig gefahrlos, wenn auch weniger gefährlich als eine rücksichtslose und nicht schonende Ausräumung.

Faßt alle Autoren sehen dann von einer aktiven Behandlung ab, wenn die Infektion den Uterus überschritten hat und Anzeichen von Parametritis, Salpingitis u. a. nachzuweisen sind.

Was die Mortalität der Aborte anbetrifft, so schwankt diese in den verschiedensten Statistiken außerordentlich je nach der Art und Schwere der in der Statistik verarbeiteten Fälle.

B e n t h i n errechnete eine wohl zu hohe Durchschnittsmortalität von 9—10% aller Aborte; die von Dietrich angegebene Zahl von durchschnittlich 4% dürfte am ehesten zutreffen.

v. J a f c h e gibt eine Durchschnittsmortalität des nicht fieberhaften, kunstgerecht behandelten Abortes von 0,05% und des fieberhaften von 4—5% an, Z a n g e m e i s t e r s entsprechende Zahlen lauten 1 und 5%.

D i e t r i c h gibt in seiner Sammelstatistik folgende Zahlen an: Bei einer Aufnahmetemperatur von über 38° ergab die aktive Behandlung 4,5%, die exspektative (Abwarten bis zur Entfieberung und Ausräumung nach 3—8 fieberfreien Tagen) 1,4%, und die rein konservative Behandlung 5,4% Mortalität.

Bei einer Aufnahmetemperatur von 37,1° bis 37,9° lauten die entsprechenden Zahlen 0,9 und 0,7%; bei sämtlichen Fällen über 37° bei aktiver Behandlung 2,1% und bei exspektativer Behandlung 1,6%.

Gibt es nun eine Möglichkeit, den vorher beschriebenen Gefahren, die mit der Ausräumung verbunden sein können, besonders der Gefahr der aufsteigenden Infektion oder der Allgemeininfektion vorzubeugen?

Die meisten Geburtshelfer empfehlen vor der Uterusentleerung neben einer genügenden Cervixdilatation eine Uterustamponade mit Glyzerin oder Jodoformgaze, die gewöhnlich nach ca. sechs Stunden wieder entfernt wird. Diese wirkt einerseits desinfizierend, andererseits wehenanregend und blutstillend, wobei Stöckel davor warnt, bei Frauen, die bereits vor der Uterusentleerung fieberten, zu tamponieren, um nicht damit den infizierten Uterusinhalt weiter in den Uterus hineinzupressen. Diese Tamponade hat weiter den Vorteil, daß sie den Cervikalkanal weit offen hält, so daß eine freie Abflußmöglichkeit aus der Uterushöhle geschaffen ist.

Andere machen eine Uteruspülung mit desinfizierenden Flüssigkeiten oder physiologischer Kochsalzlösung. Einige wischen im Anschluß daran die Uterushöhle mit Jodtinktur aus, einmal zur Desinfektion, zum andern um eine bessere Kontraktion zu erzielen. In einzelnen Fällen ätzt man statt dessen die Uterushöhle mit 10 bis 15%iger Formalinlösung oder mit Acid. carbol. liquefact, letzteres unter gleichzeitiger Scheidenspülung, um Verätzungen in der Scheide und am Introitus zu verhüten (Melaton).

Benthin empfahl 1928 Einführen von Kohlestäbchen (Merck) in den Uterus, um auf Grund der Adsorptionsfähigkeit und entgiftenden Fähigkeit der Kohle eine bessere und sichere Heilung des septischen Abortes im Sinne einer Verringerung der Toxinresorption, eines schnelleren Keimabtransportes aus der Uterushöhle u. a. zu erreichen.

Diese Kohlebehandlung hatte durchaus günstige Erfolge, was Benthin an Hand eines ausreichend großen Materials zeigen konnte. Nach Abzug von 13 von vornherein mit schweren komplizierenden parauterinen Erkrankungen eingelieferten Fälle ist es gelungen, die Mortalität des fieberhaften Abortes auf 0,3% herabzudrücken (1 Todesfall auf 300), wobei er eine Gesamtmortalität von 2,5% erreichte. Besonders empfiehlt Benthin die Kohle zur Prophylaxe und zur Verhütung von Nachkrankheiten.

Allerdings berichtet Rissmann über eine gerichtliche Sektion nach Kohlebehandlung, wobei die Lymphstränge des Mesenteriums stark mit Kohle gefüllt waren, und namentlich die Nieren

blau und stark vergrößert waren. Die Nierenkanälchen seien deutlich mit Kohle gefüllt gewesen. R i s s m a n n empfiehlt zur weiteren Aufklärung der Nebenwirkungen der Kohlebehandlung, daß alle Todesfälle feziert werden.

Im folgenden foll über eine Methode berichtet werden, die ganz besonders geeignet ift, die mit einer aktiven Behandlung des Abortes verbundenen Infektionsgefahren auszuschalten bzw. auf einen geringen Prozentfatz zu befchränken, nämlich die lokale Applikation von Terpentinöl auf die Uteruschleimhaut.

Seit etwa 30 Jahren verwendet C r a m e r zur lokalen Behandlung puerperaler Infektionen, fowie zur Vor- und Nachbehandlung aller Aborte das Terpentinöl. Als er es zum erftenmal bei einer hochfiebernden Puerpera mit ausgedehnten fchmierig-diphtheritisch belegten Puerperalgefchwüren der Portio, der Vagina und des Dammes anwandte, überrafchte ihn die fchnelle Abftoßung der nekrotifchen Membranen und Reinigung der Gefchwüre bei gleichzeitiger kritifcher Entfieberung fo, daß er diefe örtliche Terpentinbehandlung bei allen puerperalen und gynäkologifchen Infektionen einführte und weiter ausbildete.

Dabei foll fchon jetzt bemerkt fein, daß C r a m e r die Puerperalinfektion fowie alle Aborte, auch die hochfieberhaften, fo aktiv wie möglich anging und zwar mit der Curette, fo daß das Cavum uteri möglichst vollkommen von infizierten Plazentaresten und Eihautresten gefäubert war. „Ich habe diefe Verwundung der Gebärmutterwand und die Gefahr der erhöhten Imprägnation mit Infektionserregern auf mich genommen, weil ich die Überzeugung haben durfte, daß die darauffolgende Terpentinbehandlung die Bakterien des Uteruscavums vernichtet und die natürlichen Kräfte der reaktiven Entzündung fteigert“ (C r a m e r).

Bevor wir auf die Methode der Terpentinbehandlung näher eingehen, fei über die pharmakologifche Wirkung des Terpentins folgendes gefagt:

Das Terpentinöl, *oleum terebinthinae*, ift das Deftillat des aus verfchiedenen Koniferen gewonnenen Terpentinharzes. Es ift ein vielfach verwendetes Hauteizmittel. Auf die Haut appliziert,

entsteht zunächst ein Brennen, Rötung und eine regelrechte Entzündung; und nach langdauernder Einwirkung beobachtet man Nekrose und Bildung von Blasen und Eiterpusteln. Innerlich gibt man es wegen seiner desinfizierenden und adstringierenden Eigenschaft bei Erkrankungen der unteren Harnwege, ferner meist in Form von Inhalationen bei putrider Bronchitis und Bronchorrhoe. Neuerdings wendet man es auch subcutan oder intraglutäal mit Erfolg bei Furunkulose an. Die Magen- und Darm Schleimhaut ist gegen Terpentin relativ wenig empfindlich, so daß nach Meyer und Gottlieb 1,0 g und mehr täglich per os gegeben werden können. Nach längerer Darreichung können Nierenschädigungen auftreten, weil auch die Nierengefäße wie die Hautkapillaren entzündlich verändert werden, so daß man gelegentlich nach längerer Terpentinalplikation eine gesteigerte Diurese und Eiweiß und Blutkörperchen im Urin feststellen konnte.

Die Empfindlichkeit gegen Terpentin ist individuell ganz außerordentlich verschieden, so daß oft große Mengen ohne Schaden vertragen werden können. Durch Verwechslung, durch zu hohe medizinale Dosen, ferner durch Inhalationen von Terpentindämpfen sind schon schwere Vergiftungen beobachtet worden. Dabei scheint die Giftwirkung bei der Einatmung besonders groß zu sein. So fand Lewin unter 132 Anstreichern, Malern und Polierern 50, die über unangenehme Terpentinwirkungen, darunter Beschwerden beim Harnlassen und Blutharnen, Kopfschmerzen, Ohrenlaufen, Schwindel u. a. m. klagten. Auch über tödliche Terpentingiftungen wird in der Literatur berichtet. Lewin beschreibt einen Todesfall, der dadurch entstanden ist, daß ein Maler das Innere eines Kessels mit terpentinhaltiger Lackfarbe anstrich. Ferner berichtet Lewin über einen Giftmord an einem 14 Monate alten Knaben, der, nachdem er 15 g Terpentinöl geschluckt hatte, nach ca. 15 Stunden starb. Nach Trinken von Haarlemer Öl, einem volksmedizinischen Getränk von geschwefeltem Terpentin und Wachholderöl, wurde von Walcher plötzlicher Tod beobachtet.

Bei unserer Abortbehandlung wird das Terpentinöl unverdünnt direkt mit der Uteruswand in Berührung gebracht. Auf

Grund einer 30jährigen Beobachtung konnte C r a m e r feststellen, daß bei dieser Applikation die Resorption des Terpentinols sehr gering ist, so daß toxische Schädigungen nicht zu befürchten sind. In keinem der so behandelten Fälle wurden Vergiftungserscheinungen gesehen und niemals Schädigungen der Nieren beobachtet.

Damit ist an Hand eines großen Materials im Laufe von 30 Jahren die Ungefährlichkeit der Anwendung des Terpentinols auf puerperale Wundflächen erwiesen.

Die Wirkung dieser lokalen Behandlung der Uterusschleimhaut faßt C r a m e r folgendermaßen zusammen:

Erstens wirkt das Terpentinöl stark desinfizierend und entwicklungshemmend, sowie baktericid. Eine stinkende jauchende Lochialsekretion wird durch die Behandlung mit einem Schlage beseitigt. Diese desinfizierende und die Bakterienentwicklung hemmende Wirkung ist keine momentane, sondern hält Stunden und Tage an, was man an der Beschaffenheit der Wundsekrete und daran nachweisen kann, daß dieselben bis zum zweiten und dritten Tag noch den charakteristischen Terpentinogeruch zeigen. So kann man mit Hilfe des Terpentinols selbst eine schon bestehende Jauchung vollkommen beseitigen und weitere Infektionsgefahren vollständig ausschalten.

Weiter fiel C r a m e r auf, daß durch die Terpentineinwirkung kein eigentlicher Ätzschorf entsteht, wie wir ihn bei anderen Desinfektionsmitteln z. B. bei Carbolsäure, Alkohol oder Formalin beobachten. Dadurch wird eine weitere Bakterienentwicklung, wie sie gerade unter einem solchen Ätzschorf begünstigt wird, in hohem Maße vermieden werden können.

Bei stark blutenden Aborten konnte immer wieder eine rasche und sichere Blutstillung durch die Terpentinamponade erzielt werden. Diese prompte haemostatische Wirkung veranlaßte C r a m e r, alle Blutungen therapeutisch mit Terpentinamponaden anzugehen.

Schließlich bewirkt diese lokale Terpentinapplikation auf der ganzen Fläche der Einwirkung eine starke Leukozytose und starke

entzündliche Wundreaktion, wie in der Pathologie experimentell nachgewiesen ist.

So kann man durch Subcutaninjektion von Terpentinöl eine künstliche Entzündung und Eiterung ohne Mikroorganismen erzeugen. Nach Einbringen von Terpentinöl in Gefchwülste hat man eine Entzündung beobachten können, die der erysipelatösen (*Erysias migrans*) ähnlich ist (Lewin).

Bardenheuer hat diese spezifische Entzündung machende Wirkung des Terpentins genauestens untersucht. Er sah in unmittelbarem Anschluß an die subcutane Injektion in der Einstichstelle eine entzündliche Rötung und Schwellung, bald darauf Nekrose des Gewebes und später in der weiteren Umgebung einzellige Infiltration. Nach 16—18 Stunden eitriges Infiltrat, ferner massenhafte Auswanderung von Leukocyten, nach weiteren vier Stunden deutliche Demarkation. Allmählich wird ein deutlich sich abgrenzendes Granulationsgewebe gebildet, das im Laufe der folgenden Tage mehr an Umfang zunimmt. Es handelt sich also hier um eine durch das Terpentin bewirkte heftige demarkierende Entzündung um einen primären nekrotischen Herd. „Durch diese histologisch festgelegte Eigenschaft hat das Terpentin einen ganz spezifisch begünstigenden Einfluß auf denjenigen Prozeß, der unter natürlichen Verhältnissen dem Fortschreiten und Eindringen der puerperalen Infektion in die Gebärmutterwand Einhalt gebietet, nämlich auf die des Granulationswalles und die Steigerung der reaktiven Entzündung überhaupt“ (Cramer).

Gerade auf dieser spezifischen Terpentinwirkung beruhen die Erfolge der Terpentinbehandlung, besonders der septischen Aborte. Dieser eigentümlichen Wirkungsweise ist nach Cramer auch vielleicht die geringe Resorption des Terpentins bei unserer Behandlung zuzuschreiben.

Was die Technik unserer Abortbehandlung anbetrifft, wurde in allen Fällen ausschließlich nach der folgenden Methode vorgegangen:

Beim blutenden Abort muß die Cervix soweit gedehnt werden, daß eine Ausräumung möglich ist. In dem vorliegenden Material

ist grundsätzlich niemals von einer Laminariadilatation Gebrauch gemacht worden, sondern die Erweiterung des Cervikalkanals wurde, wenn nötig, durch eine Terpentintamponade, die 12 Stunden liegen blieb, herbeigeführt unter gleichzeitiger Medikation von Chinin, um die Wehen anzuregen; oder die Dehnung wurde akut mit Hegarstiften gemacht. Hierbei ist in den meisten Fällen eine Dehnung auf 12 bis 15 möglich. Unser Ziel war, in allen Fällen eine möglichst vollkommen von infizierten Plazentaresten und Eihautresten gefäuberte Uterushöhle zu schaffen; dabei sind wir grundsätzlich so aktiv wie möglich vorgegangen. In keinem der vorliegenden Fälle wurde die Ausräumung des Uterus digital ausgeführt, sondern in allen Fällen instrumental mit der Abortzange und großer nicht zu scharfer Curette.

Gleichzeitig wurde eine feste Kontraktion der Uteruswand durch Pituitrin- und Secale-Injektion erreicht. In allen Fällen wurde Länge und Verlauf des Cavum Uteri durch vorsichtiges Sondieren festgestellt.

Nachdem der Uterus vollkommen gefäubert war, wurde das Cavum mit Vioformgazestreifen austamponiert, der den Zweck hatte, das im Cavum enthaltene Blut aufzusaugen und die Uteruswand blut trocken zu machen. Unmittelbar danach wurde dieser Tampon herausgezogen und sofort ein mit Terpentin triefend getränkter Gazestreifen von derselben Länge und Breite in das Uteruscavum eingeführt und damit eine Tamponade ausgeführt, die die ganze Uteruswand in engsten Kontakt mit dem Terpentinöl bringt. Durch gelegentliches Herablaufen des Terpentinöls aus der Vagina, erzeugt es auf der äußeren Haut oft ein unangenehmes Brennen, weshalb vor der Behandlung die Haut mit einer indifferenten Salbe eingerieben werden soll. Eine andere praktische Methode der Applikation des Terpentinöls auf die Uterus Schleimhaut ist folgende: Man gießt in das mit der Öffnung etwas nach oben gehaltene Milchglaspekulum ca. 30 ccm Terpentinöl und tamponiert nun durch diesen im Vaginalgewölbe liegenden Terpentinflee mit dem Gazestreifen hindurch, so daß sich dieser gut mit Öl tränkt.

Die Terpentintamponade wurde in früheren Jahren bis etwa zum Jahre 1920 bis zum nächsten Tag liegengelassen; seit dieser Zeit aber wurde auch der Terpentintampon herausgezogen und nach Entfernung dieses Uterus-Tampons nur noch die Vagina mit einem Mullstück tamponiert, dessen Spitze vor der Portio liegend in Terpentin getränkt war. Dieser Vaginaltampon wurde am nächsten Tag entfernt. So befand sich also Scheidengewölbe und Portio in einem terpentinetränkten Medium, das jede weitere Infektion oder ein Aufsteigen von Keimen aus der Vagina in den Uterus ausschloß.

Um die Terpentinwirkung nicht zu beeinträchtigen, wurden Spülungen in den ersten Tagen nach der Auswirkung prinzipiell unterlassen.

In der Reconvalescenz wurde meistens in den ersten fünf Tagen *Secale per os* gegeben. Später wurden in manchen Fällen heiße Spülungen der Scheide mit Mutterlauge gemacht.

In kritischen Fällen, in denen die Infektion nachweislich den Uterus überschritten hatte und in denen eine Allgemeininfektion zu befürchten war, wurde selbstverständlich in der Nachbehandlung von dem notorisch wirksamen Rüstzeug gegen septische Infektionen, intravenöse Trypaflavininjektionen und in der letzten Zeit auch *Prontosil* intravenös, Gebrauch gemacht.

Es ist zu bemerken, daß eine bakteriologische Untersuchung zwecks Verwertung zur Indikationsstellung im Sinne Winters und Traugotts nicht vorgenommen worden ist, da nur der klinische Untersuchungsbefund für die Anzeigenstellung maßgebend war. Bei dem großen Material werden wohl alle Infektionserreger einmal vorhanden gewesen sein. Die Untersuchung der Frage der Einwirkung des Terpentinöles z. B. auf haemolytische Streptokokken oder auf andere für den septischen Abort in Frage kommende Bakterien geht über das Ziel dieser Arbeit hinaus und müßte von anderer Seite nachgeholt werden.

In der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung des Johanner-Krankenhauses Bonn wurden unter Leitung von Prof. C r a -

mer in der Zeit vom 1. Januar 1907 bis zum 1. Juli 1936 970 Aborte nach der oben dargelegten Methode behandelt.

Die Indikationen zur Ausräumung waren folgende:

Mit heftigen Blutungen eingeliefert	516
Unvollkommene Aborte bzw. Abortreste	203
Endometritis post abortum	14
Blutung post abortum	2
Missed abortion	8
Nicht mehr aufzuhaltender drohender Abort	1
Abortus artificialis medicinalis	195
Abortus artificialis criminalis	26
Habituelle Aborte	5

Von diesen 970 untersuchten Fällen wurden 834 = 86% fieberfrei eingeliefert bzw. waren vor der Operation fieberfrei, während 136 = 14% bereits bei der Aufnahme ins Krankenhaus bzw. vor der Operation fieberten.

Als fieberhafte Aborte wurden die angesehen, die vor der Behandlung eine Temperatur von über 38° zeigten.

Tabelle 1.

Fieberfreie Aborte.

Fieberfrei d. h. bis 38° sind eingeliefert	834 = 86 %
Davon hatten fieberfreien Verlauf	708 = 84,8 %
sekundäre Temperatursteigerung	126 = 15,2 %
und zwar eintägiges Fieber über 38°	65 = 7,7 %
mehrtägiges Fieber über 38°	61 = 7,4 %
Perforationen	0 = 0,0 %
Durchschnittl. Krankenhausaufenthalt	
bei den fieberfrei verlaufenden Aborten	5,07 Tage
bei den fieberhaft verlaufenden Aborten	7,7 Tage
Todesfälle	0 = 0 %

Tabelle 2.

Fieberhafte Aborte.

Fieberhaft d. h. über 38° sind eingeliefert	136 = %
Davon hatten 39°	21
40° und mehr	17
Durch Curettage und Terpentinbehandl.	
sofort entfiebert	67 = 49 %
Temperatursteigerung post Operationem	54 = 32 %
Davon krit. Entfieberung nach 1 Tage	25 = 46 %
Demnach wurden fieberfrei insgesamt	92 = 67,2 %
Mehrtägiges Fieber über 38°	13 = 16,2 %
Mehrtägiges Fieber über 39°	17 = 11,8 %
Perforationen	0 = 0,0 %
Todesfälle	1 = 0,72 %
Durchschnittl. Krankenhausaufenthalt	8,6 Tage
Durchschnittl. Krankenhausaufenthalt aller Aborte	6,8 Tage
Gesamt mortalität unserer untersuchten Fälle	1 = 0,103 %.

Gehen wir zunächst auf die fieberfreien Aborte ein. Von allen diesen Fällen, die mit einer Temperatur bis 38° in unsere Behandlung kamen, erlebten wir bei unserem aktiven Vorgehen mit der Abortzange und Curette unter gleichzeitiger Terpentinbehandlung keinen einzigen unglücklichen Ausgang. Vollkommen fieberhaften Verlauf während der ganzen Behandlung sahen wir in 708 Fällen, was eine komplikationslose Heilung in 84% bedeutet.


Auch wir konnten die immer wieder gefürchtete Temperatursteigerung nach Ausräumung eines Aborts beobachten, häufig mit einem heftigen reaktiven Schüttelfrost verbunden, und zwar in 126 = 15,2% der Fälle. Diese Tatsache ist dadurch zu erklären, daß ein nicht geringer Teil der eingelieferten Aborte bereits bei der Aufnahme bzw. vor der Operation infiziert ist, aber noch kein Fieber zeigt, andererseits ist dieses Fieber als Resorptionsfieber vom örtlichen Entzündungsherde aus anzusehen.

Wir haben den Eindruck, daß diese unangenehme Reaktion unter der Terpentinbehandlung viel feltener und weniger heftig

auftritt als ohne dieselbe. In den meisten Fällen trat aber schon am folgenden Tag eine kritische Entfieberung ein, so daß wir ein mehrtägiges Fieber über 38° nur in 7,4 % der Fälle beobachteten.

Ganz besonders eindrucksvoll sehen wir die Terpentinwirkung bei den Fällen, welche nach der Ausräumung, die ohne Terpentinbehandlung ausgeführt wurde, Fieber bekamen und erst durch die nachträgliche Terpentinbehandlung sehr schnell in den fieberfreien Zustand übergeführt worden sind. In Abb. 1 und 2 sind zwei solche Beispiele wiedergegeben.


Abb. 1.



Krankenblatt Nr. 1213/1911. Seit ca. 8 Tagen Blutung und Fieber, jauchige Abortreste, grävula mens. III. Curette. Nachts Schüttelfrost, am

Abend des 2. Tages 39,8. Terpentin (X), kritische Heilung.

Abb. 2.



Krankenblatt Nr. 855/1913. Blutung seit 3 Tagen, Uterus geöffnet, faustgroß. Ausräumung. Am 3. Tage zweimal Schüttelfrost, 40 Temp. Puls 110. Terpentin. Darauf kritische Heilung.

Neben dem günstigen Einfluß auf die Temperatur, sofortigem kritischen Abfall nach der Terpentinbehandlung, ist vor allem die Beeinflussung des Pulses, wie besonders deutlich Abb. 2 zeigt, auffallend.

In sämtlichen Fällen kam es zu keiner einzigen Uterusperforation, eine Gefahr, dessen sich der Operateur immer bewußt sein soll, die er, wie früher schon erwähnt, von allem erkennen soll, um durch geeignete therapeutische Maßnahmen einen unglücklichen Ausgang noch umgehen zu können.

Eine Perforationsgefahr durch die Curette ist nach Cramer relativ gering, vorausgesetzt, daß mit exakter Technik und größter Vorsicht vorgegangen wird.

Todesfälle haben wir unter unseren fieberfreien Aborten keinen einzigen zu verzeichnen, so daß wir eine Mortalitätsziffer von 0% unserer fieberfreien Aborte erreicht haben.

Der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt vom Tage der Curettage bis zur Entlassung betrug bei den fieberfreien Aborten und fieberfrei bleibenden 5,01 Tage, bei den sekundär fieberhaften 7,7 Tage. Nicht mit eingerechnet sind diejenigen Fälle, bei denen im Anschluß an die Curettage eine andere Operation wie Alexander-Adams'sche Operation, Wertheim'sche Operation, Appendektomie u. a. vorgenommen wurde, ferner diejenigen Fälle, bei denen eine den Krankenhausaufenthalt verlängernde Nachbehandlung angeschlossen wurde.

Bei septischen Erscheinungen wurde 16mal intravenöse Trypflavininjektion und 2mal eine Prontosilinjektion gemacht.

Wenden wir uns jetzt den Ergebnissen unserer Behandlung beim fieberhaften Abort zu, so sehen wir, daß von 136 z. T. hochfiebernden Aborten $67 = 49\%$ sofort nach der Curettage und Terpentinbehandlung kritisch entfieberten ohne Temperatursteigerung post operationem. Einen solchen meist wieder durch eine erhöhte Toxinresorption bedingten Temperaturanstieg beobachteten wir in $54 = 32\%$ der Fälle; von diesen entfieberten wieder nach einem Tage kritisch $25 = 46\%$, so daß wir durch Curettage unter gleichzeitiger Terpentinbehandlung eine kritische Entfieberung in insgesamt 92 Fällen d. h. in $67,2\%$ aller unserer fieberhaften Aborte erreichten. Ein mehrtägiges Fieber über 38° hatten $22 = 16\%$ und über 39° $17 = 11,8\%$.


Auch der hochfieberhafte Abort war für Cramer niemals Veranlassung, von einer radikalen Beseitigung der infizierten Massen aus dem Uterus Abstand zu nehmen, weil die darauffolgende Terpentinbehandlung die Gefahr der Allgemeininfektion des Körpers mit einiger Sicherheit auszuschalten scheint.

In Abb. 3 ist aus dem großen Material ein Beispiel eines hochfieberhaften, kriminellen Abortes dargestellt, der nach sofortiger Ausräumung und Auskratzung mit Terpentinbehandlung direkt in den fieberfreien Zustand gebracht wurde, wodurch eine schnelle Heilung erzielt wurde.

Wenn auch, wie wir in Vergleichsstatistiken sehen, eine prompte Entfieberung und Überführung in den Normalzustand

auch sonst bei aktiver Behandlung ohne Terpentin eben auf Grund der Tatsache, daß die infizierten Massen aus dem Uterus entfernt sind, eintritt, so kann doch nicht geleugnet werden, daß ein großer Teil dieses Erfolges der Terpentinwirkung zuzuschreiben ist.


Abb. 3.



Krankenblatt Nr. 741/1913. Seit 3 Tagen Blutung; mit Schüttelfrost u. Fieber 40,8 eingeliefert. Sofortige Ausräumung und Terpentinauswischung, Scheidentamponade. Kritischer Temp.-Abfall auf 37,5. Am 5. Tag nach der Operation entlassen.

Auch sehen wir in den Fällen, die nach der Ausräumung trotz Terpentin fieberhaft blieben durch eine nochmalige Terpentinbehandlung einen schnellen Temperaturabfall und Heilung, was an Abb. 4 dargestellt ist. Hier wurde vor der Operation nur ein Terpentin-Scheidentampon eingelegt, und daran die Curettage angegeschlossen. Schon am folgenden Tag trat Schüttelfrost mit hohem Fieber auf; erst durch nachträgliche Terpentinbehandlung des Uterus konnte sofortiger kritischer Temperaturwechsel erzielt werden, so daß die Patientin schon am 4. Tage nach der Operation vollkommen geheilt entlassen werden konnte.

Abb. 4.



Krankenblatt Nr. 2518/1912. Vor 14 Tagen starke Blutung mit Abgang von Stücken. Aufn.-Temp. 36,8. Scheidentemp. Curettage. Am 2. Tag Schüttelfrost mit 40,0 Temp. Terpentinbehandlung. (X) Krit. Abfall d. Temp. auf 36,6. Wohlbefinden. Am 4. Tag nach d. Operation Entlassugn.

Auch bei unferen fieberhaften Aborten erlebten wir keine einzige Uterusperforation.

Der Tod trat in einem Falle ein, worüber im folgenden näher berichtet wird. Wir bekommen demnach bei unserer Behandlungsmethode eine Mortalitätsziffer des fieberhaften Abortes von 0,72%.

Todesfall-Krankenblatt Nr. 538/1916.

X. 39 Jahre.

Diagn.: Abortus sept.

Patientin wird eingeliefert mit einer Temperatur von 38,5° und einem Puls von 120.

Ord.: Sofortige Terpentin-Tamponade, anschließend Curettage.

Am Tage nach der Operation Temp. 40,0° und Puls 134.

An den folgenden Tagen septische Temperaturkurve, Schüttelfrost.

Am 8. Tag post operationem Exitus letalis.

Bei unseren fieberhaften Aborten wurde 23mal Trypaflavin intravenös, 3mal Solarfon und Collargol sowie 2mal Prontosil intravenös gegeben.

Die durchschnittliche Behandlungsdauer der fieberhaften Aborte beträgt 8,6 Tage.

Es ist selbstverständlich, daß die Fälle, die einer Curettage bzw. unserer Terpentinbehandlung nicht mehr zugänglich waren, ferner diejenigen Fälle, bei denen auch trotz der Terpentinbehandlung der Exitus infolge krimineller Verletzungen eintreten mußte, für die Beurteilung des Wertes der Terpentinbehandlung auszuscheiden sind.

Diese Fälle von kriminellen Abtreibungen mit tödlichem Ausgang sollen aber im folgenden gesondert aufgeführt werden:

Fall 1.

Krankenblatt Nr. 1974/1913. Frau X. 40 Jahre.

Diagn.: Abortus criminalis sept. mens. III—IV.

Vom prakt. Arzt wegen Blutungen eingewiesen.

Patientin gibt an, die Frucht am Tage vor der Einweisung selbst herausgezogen zu haben. Bei der Untersuchung hängen nekrotische Fetzen aus der Vagina. Starker Foetor.

Operation: Sonde dringt nur 4 cm tief ein, Uterus vergrößert. Mit der Abortzange und Curette gelingt es, die Plazenta in toto herauszuholen. Wegen der bestehenden septischen Erscheinungen Auswischen des Uterus mit Terpentinöl.

Ord.: Secacornin. Temperatur nach d. Operation 37,5°.

2. Tag. Temperatur 38,5°, Puls 130. Abgang von übelriechenden blutigen Massen.

3. Tag. Nochmalige Terpentintamponade der Scheide und des Uterus. Es zeigt sich, daß der hintere Douglas perforiert ist. An den äußeren Genitalien, am Damm und an den kleinen Labien sowie am äußeren Muttermund starke Abschürfungen, die auf einen kriminellen Eingriff hindeuten.

Temp. 39°, Ord.: Collargol rectal.

5. Tag. Infiltration auf der rechten Beckenseite, kein abgegrenztes Exsudat. Puls 140.

12. Tag. Höchsttemperatur von 42°. Unter Verschlechterung des Pulses stirbt die Patientin an den Folgen einer Sepsis.

Es stellt sich später heraus, daß die Abtreibung durch einen Befenstiel versucht worden ist, deren Folgen die oben beschriebene Perforation des hinteren Douglas ist. Es kam dann zur gerichtlichen Sektion und Verurteilung des Abtreibers.

Fall 2.

Krankenblatt Nr. 311/1914.

X. 23 Jahre.

Diagn.: Abortus criminalis sept.

Als Folge eines kriminellen Eingriffs äußerst heftige Blutung ein bis zwei Tage lang; darauf zwei Monate lang keine Beschwerden. Seit 8 Tagen aber wieder heftiger Blutabgang und Schmerzen.

Bei der Untersuchung ist nirgends eine Perforation erkennbar. Links Adnexe und Parametrium frei. Rechtes Beckenbindegewebe von einem fulzig anzufühlenden Exsudat eingenommen, aus dem sich die Adnexe nicht heraustasten lassen.

Röntgen: Haarnadel in der Uterusgegend.

Durch Abrasio wenige Deziduareste entfernt. Terpentinauswischung des Uteruscavums, Terpentintamponade der Scheide. Am folgenden Tag Wiederholung der Tamponade. Schüttelfrost. Drei Tage später Operation: Spalten der Cervixwand vorn, Extraktion der Haarnadel am gebogenen Teil. Vernähen der Cervix, Terpentintamponade. Abends Tampon gezogen.

In den folgenden Tagen täglich mehrere Schüttelfröste mit Temperaturanstieg bis über 40°. Exsudat rechts unverändert. Unter Schlechterwerden des Pulses und unter septischen Erscheinungen Exitus letalis.

Die gerichtliche Sektion ergab folgendes:

Multiple kleine Abszesse in der Lunge. Keine Peritonitis. Abszeß zwischen hinterer Corpus-uteri-wand, Rectum, Parametri-

um. Pyovarium. Von der Mitte der hinteren Uteruswand einen Perforationskanal. Die ganze rechte Beckenwand fulzig infiltriert.

Fall 3.

Krankenblatt Nr. 525/1919.

X. 36 Jahre.

Diagn.: Abortus artefiziialis criminalis sept.

Arzt versucht die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft — ohne Indikation — mit der Curette. Es entsteht eine Perforation, weshalb der Arzt die Patientin ins Krankenhaus einweist. Patientin blutet sehr stark. Verdacht auf innere Blutung.

Ord.: Laparotomie, hier stellt man eine Uterusperforation der rechten Tubenecke mit Ausreißung des rechten Ligamentum ovarii. fest. Sofortige Uterusamputation und Terpentinamponade des Stumpfes per vaginam.

An den Folgen einer Peritonitis Exitus letalis.

Diese Fälle bestätigen wieder deutlich die Tatsache, daß die große Zahl späterer Komplikationen und der Todesfälle der Fehlgeburten in erster Linie durch die Häufigkeit des kriminellen Abortes bedingt ist, starben doch nach manchen Schätzungen jährlich 25 000 Frauen an den Folgen dieser Abtreibungsfeuche, vor der nicht genug von ärztlicher Seite gewarnt werden kann. Bedenken wir ferner, daß in Deutschland nach v. J a f c h k e etwa $\frac{3}{4}$ Millionen Kinder jährlich durch Fehlgeburten verlustig gehen, so ist es auch eine ärztliche Aufgabe, einmal die Frau wieder zu Kinderreichtum zu erziehen und sie auf ihre Pflichten gegenüber dem Volksganzen hinzuweisen, zum andern die Indikation zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft nur auf Grund genauesten Prüfung zu stellen.

Zusammenfassend läßt sich zunächst ganz allgemein sagen, daß wir mit unserer Terpentinbehandlung sowohl der fieberfreien als auch der fieberhaften Aborte ganz außerordentlich günstige Resultate erzielt haben.

Unter Zugrundelegung der Dietrich'schen Sammelstatistik erreichten wir eine durchschnittliche Mortalität des fieberfreien

Abortes von 0% gegenüber 0,9% bei Dietrich, und bei fieberhaften eine Mortalität von 0,72% gegenüber 4,5% bei Dietrich. Die durchschnittliche Gesamtmortalität aller nach unserer Methode behandelten Fälle beträgt 0,103%.

Die fieberfreien Aborte bedurften einer Krankenhausbehandlung von 5,07 bzw. 7,77 Tagen und die fieberhaften einer Krankenhausbehandlung von durchschnittlich 8,6 Tagen, wohingegen in den Statistiken eine Behandlungsdauer von 7 bis 15,1 Tagen bei aktiver Behandlung angegeben wird.

Dieses Ergebnis unserer Untersuchungen läßt die Behauptung gerechtfertigt erscheinen, daß die Terpentinölbehandlung des Uterus beim fieberfreien als auch besonders beim fieberhaften Abort einer Verbreitung von Keimen Einhalt gebietet und einer evtl. Allgemeininfektion vorbeugt, und somit die Curettage zu einer wenig gefährlichen Operation macht.

Ferner ist die Terpentinölbehandlung geeignet, neben einer sehr geringen Mortalität besonders sicher und rasch die Heilung und Arbeitsfähigkeit zu erzielen.

Diese Tatsache sollte dem Terpentinöl einen größeren Platz in der Behandlung der Fehlgeburten einräumen.

Literatur.

- Bardenheuer: Über die histolog. Vorgänge bei der durch Terpentin hervorgerufenen Entzündung im Unterhautzellgewebe. Zieglers Beiträge z. path. Anatomie u. allg. Pathologie. 1891, Bd. X.
- Benthin: Der fieberhafte Abort. Prakt. Ergebn. f. Gynäk. 1917 (7).
— Erfahrungen mit der Kohlebehandlung des fieberhaften Abortes. Ztbl. f. Gynäkol. 1930 (43).
- Cramer: Das Terpentinöl in der Prophylaxe u. Behandlung puerperaler und gynäkolog. Infektionen. Monatsch. f. Geburtsh. und Gynäk. 1914, Bd. XXXIX. Heft 6.
- Dietrich: Das Ergebnis der Sammelstatistik über die Behandlung des fieberhaften Abortes. Ztbl. f. Gynäk. 1923 (27).
- Dörfler: Der Abortus. Münch. Med. Woch. 1934. Nr. 39.
- Halban: Zur Behandlung der Fehlgeburten. Ztbl. f. Gynäk. 1921 (12).
- Heynemann: Fehlgeburt und Frühgeburt, klinischer Teil, in Halban-Seitz, Biologie u. Pathologie des Weibes, 1927, Bd. VII, 1.
- v. Jaschke: Die Behandlung des fieberhaften Abortes. Ztbl. f. Gynäk. 1921 (44).
— Lehrbuch der Geburtshilfe. 1935.
- Latzko: Die Behandlung des fieberhaften Abortes. Ztbl. f. Gynäk. 1921 (12).
- Lewin: Die Nebenwirkungen der Arzneimittel. Berlin 1899, 3. Aufl.
— Gifte und Vergiftungen. Berlin. 1929.
- Ludwig: Die Abortbehandlung. Prakt. Ergebn. d. Geburtsh. 1913 (5).
- Maleton: Die Abrasio mucosae uteri. Inaug.-Diff. Bonn 1936.
- Meyer u. Gottlieb: Die experimentelle Pharmakologie als Grundlage der Arzneibehandlung. 8. Aufl. Berlin u. Wien. 1933.
- Peller: Fehlgeburt und Bevölkerungsfrage. Stuttgart. 1931.
- Pohl: in Starkenstein-Rost-Pohl: Toxikologie. 9. Aufl. Leipzig 1930.
- Poulsen: Lehrbuch der Pharmakologie. 9. Aufl. Leipzig 1930.
- Rissmann: in Ztbl. f. Gynäkolog. 1930 (43), S. 2723.
- Stöckel: Lehrbuch der Geburtshilfe. 4. Aufl. Jena 1935.
- Walcher: Plötzlicher Todesfall durch Haarlemer Oel. Medizin. Klinik, 1920, 340.
- Winter: Intrauterine Eingriffe im infizierten Uterus. Ztbl. f. Gynäk. 1910 (46).
— Zur Prognose und Behandlung des septischen Abortes. Ztbl. f. Gynäk. 1911 (15).
— Die 12jährige Diskussion über den fieberhaften Abort. Ztbl. f. Gynäk. 1923, Nr. 28.
- Zangemeister: Lehrbuch der Geburtshilfe. 1927.

Herrn Professor C r a m e r möchte ich an dieser Stelle für die freundliche Überlassung des Themas und für seine wertvollen Anregungen bei der Ausführung der Arbeit meinen herzlichen Dank aussprechen. Ebenfalls danke ich Herrn Professor S i e b k e für die Übernahme des Korreferates.

Lebenslauf.

Am 5. Dezember 1910 wurde ich, Paul Böckmann, in Wadersloh i. Westf. als Sohn des Brennereibesitzers Stefan Böckmann und seiner Ehefrau Elifabeth Theodora geb. Schulze Struchtrup geboren. Nach vierjährigem Besuch der Volksschule in Wadersloh besuchte ich die Rektoratschule in Lippstadt und bis zur Erlangung der Obersekundereife das Städt. Gymnasium in Beckum, anschließend trat ich in das Städt. Realgymnasium in Ahlen i. Westf. über, wo ich Ostern 1930 das Zeugnis der Reife erhielt. Nach zweifemestrigem Studium der Zahnheilkunde begann ich an der Universität in München das vorklinische Studium der Medizin im Sommersemester 1931 und legte im Sommer 1932 in Bonn die ärztliche Vorprüfung ab. Das klinische Studium verbrachte ich an den Universitäten Bonn, Wien und Berlin. Das ärztliche Staatsexamen bestand ich am 13. Dez. 1935 in Bonn. Ab 15. Dezember 1935 war ich als Medizinal-Praktikant vier Monate an der Hautklinik (Prof. Grütz) und acht Monate an der Med. Poliklinik (Prof. Bürger) der Universität Bonn beschäftigt. Zum 15. Dezember 1936 erhielt ich meine Bestallung als Arzt. Seit dieser Zeit bin ich als Volontärassistent an der Med. Poliklinik Bonn tätig.
